

Arthroplus®

Δισκίο 70 mg

Alendronic acid ως Alendronate sodium trihydrate

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειασθεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε οποιοσδήποτε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο συμπληρώθηκε για εσάς. Δεν πρέπει να το δώσετε σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσετε την πληροφορία στην παράγραφο 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ARTHROPLUS πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το ARTHROPLUS και ποια είναι η χρήση του.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το ARTHROPLUS.
3. Πώς να πάρετε το ARTHROPLUS.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.
5. Πώς να φυλάσσεται το ARTHROPLUS.
6. Λοιπές πληροφορίες.

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ARTHROPLUS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Τι είναι το ARTHROPLUS;

Το ARTHROPLUS ανήκει σε μία κατηγορία μη-ορμονικών φαρμάκων που ονομάζονται διφωσφονικά.

Το ARTHROPLUS προλαμβάνει την οστική απώλεια που παρουσιάζεται στις γυναίκες, κατά την εμμηνόπαυση, και βοηθά στην αναδόμηση του οστού. Μειώνει τον κίνδυνο των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου.

Ποια είναι η χρήση του ARTHROPLUS;

Ο γιατρός σας συνταγογράφησε ARTHROPLUS για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Το ARTHROPLUS μειώνει τον κίνδυνο των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου.

Το ARTHROPLUS είναι θεραπεία μία φορά την εβδομάδα.

Τι είναι οστεοπόρωση;

Οστεοπόρωση είναι η λέπτυνση και η εξασθένηση των οστών. Είναι συνηθισμένη στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Κατά την εμμηνόπαυση, οι ωοθήκες σταματούν να παράγουν τις θηλυκές ορμόνες, τα οιστρογόνα, τα οποία βοηθούν να διατηρείται υγιής ο σκελετός της γυναίκας. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζεται οστική απώλεια και τα οστά εξασθενούν. Όσο πιο νωρίς μπαίνει στην εμμηνόπαυση μία γυναίκα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για οστεοπόρωση.

Στα αρχικά στάδια, η οστεοπόρωση συνήθως δεν έχει συμπτώματα. Εάν δε θεραπευθεί ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε κατάγματα.

Αν και τα κατάγματα προκαλούν πόνο συνήθως, τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης μπορεί να διαφύγουν απαρατήρητα μέχρις ότου προκαλέσουν απώλεια ύψους. Τα κατάγματα μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια φυσιολογικών καθημερινών ασχολιών π.χ. αν σηκώνει κανείς ένα βάρος ή από μικρούς τραυματισμούς που συνήθως δεν προκαλούν κατάγματα των οστών. Τα κατάγματα συμβαίνουν συνήθως στο ισχίο, στη σπονδυλική στήλη, στον καρπό και δεν προκαλούν μόνο πόνο, αλλά σημαντικά προβλήματα, όπως κύφωση (καμπούρα στην πλάτη) και απώλεια κινητικότητας.

Πώς μπορεί να θεραπευθεί η οστεοπόρωση;

Η οστεοπόρωση μπορεί να θεραπευθεί και ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσετε τη θεραπεία. Το ARTHROPLUS όχι μόνο προλαμβάνει την οστική απώλεια, αλλά βοηθά εκτός αυτού στην αναδόμηση του οστού που μπορεί να έχετε χάσει και μειώνει τον κίνδυνο οστικών καταγμάτων στη σπονδυλική στήλη και στο ισχίο.

Όπως και τη θεραπεία σας με ARTHROPLUS, ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει αλλαγές στον τρόπο της ζωής σας, προκειμένου να βοηθήσει την κατάστασή σας, όπως:

Διακοπή του καπνίσματος

Το κάπνισμα φαίνεται ότι αυξάνει το ρυθμό της οστικής απώλειας και, για αυτό, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο οστικών καταγμάτων.

Άσκηση

Όπως οι μύες, τα οστά χρειάζονται εξάσκηση για να παραμείνουν ισχυρά και υγιή. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα εξάσκησης.

Δίαιτα με ισορροπημένη διατροφή

Ο γιατρός σας μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά με τη δίαιτά σας ή εάν θα πρέπει να λάβετε κάποια συμπληρώματα διατροφής (ιδιαίτερα ασβέστιο και βιταμίνη D).

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ARTHROPLUS

Μην πάρετε ARTHROPLUS:

1. εάν είστε αλλεργική (υπερευαίσθητη) στο alendronate sodium trihydrate ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του φαρμάκου.
2. εάν παρουσιάζετε ορισμένα προβλήματα του φάρυγγα/οισοφάγου (οισοφάγος - ο σωλήνας που συνδέει το στόμα με το στομάχι), όπως στένωση ή δυσκολία στην κατάποση.
3. εάν δεν μπορείτε να στέκεστε ή να κάθεστε σε όρθια στάση για 30 λεπτά τουλάχιστον.
4. εάν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα.

Εάν πιστεύετε ότι κάτι από αυτά σας αφορά, μην παίρνετε αυτά τα δισκία. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας πρώτα και ακολουθείστε τις οδηγίες του.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το ARTHROPLUS

Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας προτού πάρετε ARTHROPLUS:

- εάν υποφέρετε από προβλήματα των νεφρών
- εάν έχετε κάποιες αλλεργίες
- εάν έχετε κάποια προβλήματα στην κατάποση ή πεπτικά προβλήματα
- εάν έχετε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα
- εάν έχετε νόσο των ούλων
- εάν έχετε προγραμματίσει εξαγωγή οδόντος

Πρέπει να ληφθεί υπόψιν η εξαγωγή οδόντος προτού αρχίσετε τη θεραπεία με ARTHROPLUS εάν έχετε κάποιο από τα παρακάτω:

- εάν έχετε καρκίνο
- εάν κάνετε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία
- εάν παίρνετε στεροειδή
- εάν δεν κάνετε οδοντική φροντίδα ρουτίνας
- εάν έχετε νόσο των ούλων

Πρέπει να ακολουθείτε κατά τη διάρκεια της θεραπείας κατάλληλη προληπτική οδοντιατρική φροντίδα, όπως συνιστάται από τον οδοντίατρο.

Ερεθισμός, φλεγμονή ή εξέλκωση του φάρυγγα/οισοφάγου (οισοφάγος - ο σωλήνας που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας) συχνά με συμπτώματα θωρακικού άλγους, οπισθοστερνικού καύσου ή δυσκολία ή πόνος κατά την κατάποση μπορεί να εμφανισθούν, ιδιαίτερα εάν οι ασθενείς δεν πίνουν ένα γεμάτο ποτήρι νερό και/ή εάν ξαπλώνουν σε λιγότερο από 30 λεπτά από τη λήψη του ARTHROPLUS. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να επιδεινωθούν εάν οι ασθενείς συνεχίζουν να λαμβάνουν ARTHROPLUS μετά την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Είναι πιθανόν τα συμπληρώματα ασβεστίου, τα αντιόξινα και ορισμένα από του στόματος χορηγούμενα φάρμακα, να επηρεάσουν την απορρόφηση του ARTHROPLUS, εάν ληφθούν ταυτόχρονα. Για αυτό, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ARTHROPLUS.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.

Λήψη τροφής και ποτών με το ARTHROPLUS

Είναι πιθανόν, οι τροφές και τα ποτά (συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού νερού) να καταστήσουν μικρότερη την αποτελεσματικότητα του ARTHROPLUS, εάν ληφθούν ταυτόχρονα.

Για αυτό είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες στην παράγραφο 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ARTHROPLUS.

Παιδιά και έφηβοι

Το ARTHROPLUS δεν πρέπει να χορηγείται στα παιδιά και στους έφηβους.

Κύηση και γαλουχία

Το ARTHROPLUS προορίζεται για χρήση σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μόνο. Δεν πρέπει να πάρετε ARTHROPLUS εάν είστε ή νομίζετε ότι είστε έγκυος ή εάν θηλάζετε.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Το ARTHROPLUS δε φαίνεται να επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ARTHROPLUS**Να λαμβάνετε το δισκίο ARTHROPLUS μία φορά την εβδομάδα.**

Ακολουθείστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά για να είναι βέβαιο ότι θα έχετε όφελος από το ARTHROPLUS.

- 1) Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας, η οποία ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραμμά σας. Κάθε εβδομάδα, να λαμβάνετε ένα δισκίο ARTHROPLUS την ημέρα της επιλογής σας.

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες 2), 3), 4) και 5) για να βοηθήσετε ώστε το δισκίο ARTHROPLUS να φθάνει στο στομάχι σας γρήγορα και να βοηθήσετε να μειωθεί η πιθανότητα ερεθισμού του φάρυγγα/οισοφάγου (οισοφάγος - ο σωλήνας που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας).

- 2) Αφού σηκωθείτε από το κρεβάτι τη συγκεκριμένη ημέρα και πριν τη λήψη του οποιουδήποτε γεύματος, ροφήματος ή άλλου φαρμακευτικού σκευάσματος, καταπιείτε το δισκίο ARTHROPLUS με ένα γεμάτο ποτήρι νερό μόνο (όχι μεταλλικό νερό) (όχι λιγότερο από 200 ml ή 7 fl. oz.).
 - Να μην το λαμβάνετε με μεταλλικό νερό (ανθρακούχο ή μη).
 - Να μην το λαμβάνετε με καφέ ή τσάι.
 - Να μην το λαμβάνετε με χυμό ή γάλα.

Μη μασάτε ή διαλύετε το δισκίο στο στόμα σας.

- 3) Μην ξαπλώνετε - παραμείνετε σε όρθια θέση (καθιστές, όρθιες ή βαδίζοντας) για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την κατάποση του δισκίου. Μην ξαπλώνετε έως τη λήψη του πρώτου γεύματος της ημέρας.
- 4) Μην λαμβάνετε ARTHROPLUS εφόσον δεν έχετε σηκωθεί από το κρεβάτι, το πρωί ή όταν ξαπλώνετε για ύπνο.
- 5) Εάν παρουσιάσετε δυσκολία ή πόνο κατά την κατάποση του δισκίου, πόνο στο στήθος ή νεοεμφανιζόμενο οπισθοστερνικό καύσο ή επιδείνωση του οπισθοστερνικού καύσου, διακόψτε το ARTHROPLUS και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
- 6) Μετά την κατάποση του δισκίου ARTHROPLUS περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν πάρετε το πρώτο σας γεύμα, ποτό ή άλλο φάρμακο της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των αντιόξινων, των συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμινών. Το ARTHROPLUS είναι αποτελεσματικό μόνο εάν λαμβάνεται με άδειο στομάχι.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση ARTHROPLUS από την κανονική

Εάν πάρετε από λάθος περισσότερα δισκία από ό,τι πρέπει, πιείτε ένα γεμάτο ποτήρι γάλα και αμέσως μετά επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Μην προκαλέσετε μόνη σας εμετό και μην ξαπλώσετε.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το ARTHROPLUS

Εάν παραλείψετε να πάρετε μία δόση, απλώς να λάβετε ένα δισκίο ARTHROPLUS το επόμενο πρωί, αφοτου το θυμηθείτε. *Δεν πρέπει να πάρετε δύο δισκία την ίδια ημέρα.* Επιστρέψατε στο ένα δισκίο μία φορά την εβδομάδα, την ημέρα της επιλογής σας, όπως είχατε αρχικά προγραμματίσει.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το ARTHROPLUS

Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να λαμβάνετε το ARTHROPLUS για όσο διάστημα ο γιατρός σας το συνταγογραφεί. Το ARTHROPLUS μπορεί να θεραπεύσει την οστεοπόρωση μόνο εάν συνεχίσετε να παίρνετε τα δισκία.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το ARTHROPLUS, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται για να περιγραφούν πόσο συχνά έχουν αναφερθεί οι ανεπιθύμητες ενέργειες:

Πολύ συχνές (που εμφανίζονται τουλάχιστον σε 1 στους 10 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία).

Συχνές (που εμφανίζονται τουλάχιστον σε 1 στους 100 και λιγότερο από 1 στους 10 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία).

Όχι συχνές (που εμφανίζονται τουλάχιστον σε 1 στους 1.000 και λιγότερο από 1 στους 100 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία).

Σπάνιες (που εμφανίζονται τουλάχιστον σε 1 στους 10.000 και λιγότερο από 1 στους 1.000 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία).

Πολύ σπάνιες (που εμφανίζονται σε λιγότερο από 1 στους 10.000 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία).

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:

Σπάνιες: Αλλεργικές αντιδράσεις όπως κνίδωση, οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα και/ή στο φάρυγγα, που προκαλεί πιθανόν δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση.

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης:

Σπάνιες: Συμπτώματα ενδεικτικά του χαμηλού επιπέδου ασβεστίου στο αίμα συμπεριλαμβανομένων των μυϊκών κραμπών ή σπασμών και/ή αίσθηση μυρμηκίασης στα δάχτυλα ή γύρω από το στόμα.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος:

Συχνές: Κεφαλαλγία.

Διαταραχές των οφθαλμών:

Σπάνιες: Θολή όραση, πόνος ή ερυθρότητα του οφθαλμού.

Γαστρεντερικές διαταραχές:

Συχνές: Κοιλιακό άλγος, αίσθημα δυσφορίας στο στομάχι ή ερυγές μετά το φαγητό, δυσκοιλιότητα, αίσθημα πληρότητας ή φουσκώματος του στομάχου, διάρροια, μετεωρισμός, οπισθοστερνικός καύσος, δυσκολία στην κατάποση, πόνος κατά την κατάποση, εξέλκωση του φάρυγγα/οισοφάγου (οισοφάγος - ο σωλήνας που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας) που μπορεί να προκαλέσει θωρακικό άλγος, οπισθοστερνικό καύσο ή δυσκολία ή πόνο κατά την κατάποση.

Όχι συχνές: Ναυτία, έμετος, ερεθισμός ή φλεγμονή του φάρυγγα/οισοφάγου (οισοφάγος - ο σωλήνας που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας) ή του στομάχου, μαύρα ή όμοια με πίσσα κόπρανα.

Σπάνιες: Στένωση του φάρυγγα/οισοφάγου (οισοφάγος - σωλήνας που ενώνει το στόμα σας με το στομάχι σας), στοματικά έλκη όταν τα δισκία μασώνται ή μυζούνται στο στόμα, στομαχικά ή πεπτικά έλκη (μερικές φορές σοβαρά ή με αιμορραγία).

Δέρμα:

Όχι συχνές: Εξάνθημα, κνησμός, ερύθημα του δέρματος.

Σπάνιες: Εξάνθημα που επιδεινώνεται με το ηλιακό φως.

Πολύ σπάνιες: Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις

Μυοσκελετικές:

Συχνές: Πόνος στα οστά, στους μύες και/ή στις αρθρώσεις.

Σπάνιες: Προβλήματα της γνάθου που σχετίζονται με καθυστερημένη επούλωση και φλεγμονή, συχνά μετά από εξαγωγή οδόντων.

Δυνατός πόνος στα οστά, στους μύες και/ή στις αρθρώσεις.

Γενικές διαταραχές:

Σπάνιες: Παροδικά συμπτώματα όπως αυτά της γρίπης, όπως μυϊκά άλγη, γενική αίσθηση αδιαθεσίας και μερικές φορές με πυρετό, συνήθως κατά την έναρξη της θεραπείας.

Με τη διάρκεια της εμπειρίας που αποκτήθηκε μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες (αγνώστου συχνότητας):

Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Ζάλη.

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος: Οίδημα στις αρθρώσεις.

Κάταγμα του μηριαίου οστού σε ασθενείς με μακροχρόνια θεραπεία με αλενδρονικό οξύ. Πόνος στο μηρό, αδυναμία του σκέλους ή τοπική ενόχληση πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδείξεις πιθανού κατάγματος του οστού του μηρού.

Γενικές διαταραχές: Κόπωση, οίδημα των χεριών και των ποδιών.

Εργαστηριακά ευρήματα:

Πολύ συχνά:

Ήπια και παροδική μείωση του ασβεστίου του αίματος και των επιπέδων των φωσφορικών, γενικά εντός των φυσιολογικών πλαισίων.

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αμέσως σχετικά με αυτά ή οποιαδήποτε άλλα ασυνήθιστα συμπτώματα.

Θα βοηθήσει, εάν σημειώσετε τι έχετε παρουσιάσει, τότε άρχισε και πόσο διήρκεσε.

Εάν κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνεται σοβαρή ή παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

5. ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ARTHROPLUS

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Μη χρησιμοποιείτε το ARTHROPLUS μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στο blister. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Για αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες φύλαξης. Μην αφαιρείτε τα δισκία από τη συσκευασία blister μέχρι να είστε έτοιμοι να πάρετε το φάρμακο.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το ARTHROPLUS

Δραστική ουσία:

Η δραστική ουσία είναι alendronate sodium trihydrate.

Κάθε δισκίο περιέχει 70 mg alendronic acid ως alendronate sodium trihydrate.

Άλλα συστατικά: Sorbitol, Starch maize, Sodium starch glycolate, Stearic acid, Magnesium stearate.

Εμφάνιση του ARTHROPLUS και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα δισκία διατίθενται σε blister ALU/ALU σε κουτιά στις ακόλουθες συσκευασίες:

- 4 δισκία (1 blister ALU/ALU που περιέχει 4 δισκία).
- 8 δισκία (2 blister ALU/ALU που το καθένα περιέχει 4 δισκία).
- 12 δισκία (3 blister ALU/ALU που το καθένα περιέχει 4 δισκία).

Μπορεί να μην κυκλοφορήσουν όλες οι συσκευασίες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ, Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα, Τηλ.: 210 5224830, Φαξ: 210 5224838,
E-mail: info@targetpharma.gr, <http://www.targetpharma.gr>.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: RAFARM ΑΕΒΕ.

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά: 24 Ιουλίου 2009.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.