

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΑΡΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Forcet 50 mg δισκία
Forcet 100 mg δισκία

Σουματριπτάνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για εσάς. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα γιατρό σας, ή στο φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr)

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το Forcet και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Forcet
3. Πως να πάρετε το Forcet
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Forcet
6. Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FORCET ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το Forcet ανήκει στη κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται τριπτάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ημικρανίας.

Τα συμπτώματα ημικρανίας μπορεί να προκαλούνται από την προσωρινή διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων στο κεφάλι. Το Forcet θεωρείται ότι ελαττώνει τη διεύρυνση αυτών των αιμοφόρων αγγείων. Αυτό με τη σειρά του βοηθά στην απομάκρυνση της κεφαλαλγίας και στην υποχώρηση άλλων συμπτωμάτων της κρίσης ημικρανίας, όπως το αίσθημα ασθένειας (ναυτία ή έμετος) και ευαισθησία στο φως και στους ήχους.

Το Forcet λειτουργεί μόνο όταν η κρίση ημικρανίας έχει ξεκινήσει. Δεν αποτρέπει την έναρξη της κρίσης.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε σουματριπτάνη για την πρόληψη κρίσης ημικρανίας.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ FORCET

Μην πάρετε το Forcet:

- σε περίπτωση **αλλεργίας** (υπερευαισθησίας) στη σουματριπτάνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Forcet (βλ. λίστα παράγραφος 6)
- εάν **έχετε καρδιακά προβλήματα**, όπως στένωση των αρτηριών (Ισχαιμική Καρδιακή Νόσος) ή θωρακικό άλγος (στηθάγχη), ή έχετε ήδη υποστεί καρδιακή προσβολή.
- εάν **είχατε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο** ή μικρής έκτασης εγκεφαλικό επεισόδιο (που ονομάζεται επίσης παροδική ισχαιμική κρίση ή ΤΙΑ)

- εάν έχετε **προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια σας** που προκαλούν πόνους τύπου κράμπας όταν περπατάτε (νόσος περιφερικών αγγείων)
- εάν έχετε **υψηλή αρτηριακή πίεση**. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε το Forcet εάν η υπέρτασή σας είναι ήπια και λαμβάνετε θεραπεία
- εάν έχετε σοβαρή **ανεπάρκεια της ηπατικής λειτουργίας**
- **Με άλλα φάρμακα για την ημικρανία**, που περιέχουν εργοταμίνη, ή άλλα παρόμοια φάρμακα όπως μεθυλσεργίδη ή κάθε αγωνιστή του υποδοχέα τριπτάνης/5-HT₃ (φάρμακα που χρησιμοποιούνται επίσης για τη θεραπεία της ημικρανίας)
- **Με άλλα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που ονομάζονται MAOIs** (αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης), ή εάν έχετε λάβει αυτού του είδους τα φάρμακα τις τελευταίες 2 εβδομάδες.

Εάν έχετε εκδηλώσει κάποιο από τα παραπάνω:

→ **Συμβουλευτείτε το γιατρό σας, και μη λαμβάνετε το Forcet**

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Forcet

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Forcet, θα πρέπει να αναφέρετε στον ιατρό σας ορισμένες πληροφορίες:

Εάν έχετε πρόσθετους παράγοντες κινδύνου:

- Εάν είστε **μανιώδης καπνιστής**, ή αν χρησιμοποιείτε **θεραπεία με υποκατάστατο νικοτίνης** και ειδικά
- Εάν είστε **άνδρας ηλικίας άνω των 40**, ή
- Εάν είστε **γυναίκα κατά την εμμηνόπαυση**

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μετά τη λήψη της σουματριπτάνης, ασθενείς έχουν εκδηλώσει σοβαρά καρδιακά επεισόδια, ακόμα και αν δεν είχαν εκδηλώσει σημάδια καρδιακού νοσήματος στο παρελθόν. Εάν κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα εμφανιστούν σε σας τότε αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να εκδηλώσετε καρδιακό νόσημα – γι' αυτό:

→ **Ενημερώστε το γιατρό σας έτσι ώστε να μπορεί να εξεταστεί η καρδιακή σας λειτουργία πριν σας συνταγογραφηθεί το Forcet**

- Εάν έχετε **ιστορικό επιληπτικών κρίσεων**

ή αν έχετε άλλες ενδείξεις οι οποίες κάνουν πιο πιθανή την εκδήλωση επιληπτικής κρίσης – για παράδειγμα, ένας τραυματισμός στο κεφάλι ή αλκοολισμός.

- Εάν έχετε **ηπατική ή νεφρική νόσο**

→ **Ενημερώστε το γιατρό σας έτσι ώστε να παρακολουθείστε συχνότερα.**

- Εάν είστε **αλλεργικός στα αντιβιοτικά που ονομάζονται σουλφοναμίδες**

Εάν είστε όντως, μπορεί επίσης να είστε αλλεργικός και στο Forcet. Εάν γνωρίζετε ότι είστε αλλεργικός σε ένα αντιβιοτικό αλλά δεν είστε σίγουροι εάν είναι η σουλφοναμίδη:

→ **Ενημερώστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας προτού να χρησιμοποιήσετε το Forcet.**

- Εάν λαμβάνετε **αντικαταθλιπτικά που ονομάζονται SSRIs** (Επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης) ή **SNRIs** (Αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης νοραδρεναλίνης)

→ **Ενημερώστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας προτού να χρησιμοποιήσετε το Forcet.** Βλέπε επίσης “Λήψη άλλων φαρμάκων” παρακάτω.

- Εάν χρησιμοποιείτε **συχνά το Forcet**

Η πολύ συχνή χρήση της σουματριπτάνης μπορεί να επιδεινώσει τις κεφαλαλγίες.

→ **Ενημερώστε το γιατρό σας αν αυτό εκδηλωθεί σε σας.** Αυτός ή αυτή μπορεί να σας συστήσει να διακόψετε τη λήψη του Forcet.

- **Εάν αισθανθείτε πόνο ή σφίξιμο στο λαιμό μετά τη λήψη του Forcet**

Αυτές οι επιδράσεις μπορεί να είναι έντονες αλλά συνήθως περνάνε γρήγορα. Εάν δεν περάσουν γρήγορα, ή αν γίνουν σοβαρές:

→ **Λάβετε ιατρική βοήθεια αμέσως.** Η παράγραφος 4 αυτού του εντύπου έχει πολλές πληροφορίες για αυτές τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Ενημερώστε το γιατρό σας, εάν λαμβάνετε ή έχετε λάβει πρόσφατα άλλα φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει φυτικά προϊόντα ή φάρμακα που έχετε αγοράσει χωρίς ιατρική συνταγή. Μερικά φάρμακα δε πρέπει να λαμβάνονται με το Forcet και μερικά άλλα μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες εάν ληφθούν παράλληλα με το Forcet. **Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε:**

- **Εργοταμίνη** που χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία της **ημικρανίας**, ή άλλα παρόμοια φάρμακα όπως η μεθυλοσεργρίδη (βλ. παράγραφο 2). Μην χρησιμοποιείτε το Forcet ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα. Σταματήστε να λαμβάνετε αυτά τα φάρμακα τουλάχιστον 24 ώρες προτού χρησιμοποιήσετε το Forcet. Μην λαμβάνετε ξανά καθόλου φάρμακα που περιέχουν εργοταμίνη ή συστατικά παρόμοια με την εργοταμίνη για τουλάχιστον 6 ώρες μετά τη λήψη του Forcet.
- **Άλλοι ανταγωνιστές του υποδοχέα τριπτάνης/5-HT₁** (όπως νατριπτανή, ριζατριπτανή, ζολμιτριπτανή), οι οποίοι χρησιμοποιούνται επίσης για τη θεραπεία της **ημικρανίας** (βλ. παράγραφο 2). Μην χρησιμοποιείτε το Forcet ταυτόχρονα με αυτά φάρμακα. Σταματήστε να λαμβάνετε αυτά τα φάρμακα για τουλάχιστον 24 ώρες προτού χρησιμοποιήσετε το Forcet. Μην πάρετε άλλο triptan/5-HT₁ αγωνιστής υποδοχέων και πάλι για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τη χρήση Forcet.
- **SSRIs** (Εκλεκτικοί Αναστολείς Επαναπρόσληψης Σεροτονίνης) ή **SNRIs** (Αναστολείς Επαναπρόσληψης Σεροτονίνης Ναραδρεναλίνης) που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της **κατάθλιψης**. Λαμβάνοντας το Forcet παράλληλα με αυτά τα φάρμακα μπορεί να προκληθεί το σύνδρομο Σεροτονίνης (μία σειρά συμπτωμάτων η οποία περιλαμβάνει κόπωση, σύγχυση, εφίδρωση, παραισθήσεις, αυξημένα αντανακλαστικά, μυϊκούς σπασμούς, ρίγη, αυξημένους καρδιακούς παλμούς και τρέμουλο). Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας αν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα.
- **MAOIs** (αναστολείς μονοαμινικής οξειδάσης) που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της **κατάθλιψης**. Μην χρησιμοποιείτε το Forcet εάν έχετε πάρει αυτά τα φάρμακα τις 2 τελευταίες εβδομάδες.
- Το βότανο **St John's** (Hypericum Parforatum). Λαμβάνοντας θεραπεία με φυτικά προϊόντα που περιέχουν το βότανο St John's ενώ λαμβάνετε παράλληλα το Forcet είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Κύηση και θηλασμός

- **Εάν είστε έγκυος ή ενδέχεται να είστε έγκυος**, ενημερώστε το γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε το Forcet. Υπάρχουν μόνο περιορισμένες πληροφορίες για την ασφάλεια της σουματριπτανής στις εγκύους γυναίκες, παρόλο που μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αυξημένο κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών. Ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας εάν πρέπει ή όχι να χρησιμοποιήσετε το Forcet ενώ είστε έγκυος.
- **Μην θηλάζετε το μωρό σας για 12 ώρες μετά τη χρήση του Forcet.** Μην δίνετε στο παιδί σας μητρικό γάλα εκπιεζόμενο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Ενδέχεται να αισθανθείτε υπνηλία, είτε από τα συμπτώματα της ημικρανίας, είτε από τη λήψη του φαρμάκου. **Εάν αντιδράσετε με αυτόν τον τρόπο, μην οδηγήσετε ή χρησιμοποιήσετε μηχανήματα.**

Η χρήση σουματριπτάνης μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως ζάλη και αδυναμία, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την ταχύτητα αντίδρασής σας. Περιμένετε μέχρι να διαπιστώσετε πώς αντιδράτε στη σουματριπτάνη πριν οδηγήσετε ή χρησιμοποιήσετε μηχανήματα.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Forcet

Το Forcet περιέχει το σάκχαρο **λακτόζη**. Αν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ FORCET

Παντοτε να παίρνετε το Forcet αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Δοσολογία:

Ενήλικες:

Η συνήθης δόση είναι 50 mg Forcet στην περίπτωση κρίσης ημικρανίας. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να χρειάζεται να λάβουν δόση 100 mg Forcet.

Παιδιά και έφηβοι (ηλικίας κάτω των 18 ετών)

Το Forcet δεν συνιστάται σε παιδιά & εφήβους.

Ηλικιωμένοι (ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών)

Το Forcet δεν συνιστάται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια

Ο γιατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει Forcet 50 mg.

Μέθοδος χορήγησης:

Λάβετε ένα δισκίο με νερό, προτιμότερα όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την έναρξη της κρίσης ημικρανίας. Μη μασάτε ή σπάτε τα δισκία.

Εάν αισθανθείτε ότι η δράση του Forcet είναι πολύ ισχυρή ή όχι αρκετά ισχυρή, αναφέρετε το στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας.

Διάρκεια της θεραπείας:

Εάν δε μειθούν τα συμπτώματα μετά την πρώτη δόση, δεν πρέπει να λάβετε δεύτερη δόση για την ίδια κρίση. Στην περίπτωση επακόλουθης κρίσης, μπορεί να ληφθεί ξανά Forcet.

Εάν, μετά την πρώτη δόση, μειθούν τα συμπτώματά σας, αλλά κατόπιν επανέλθουν, μπορείτε να λάβετε δεύτερη ή τρίτη δόση, υπό την προϋπόθεση ότι αναμένετε τουλάχιστον 2 ώρες μεταξύ των δόσεων.

Δεν πρέπει να λάβετε περισσότερα από 300 mg Forcet σε οιαδήποτε περίοδο 24 ωρών.

Δε θα πρέπει να υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Forcet από την κανονική

Εάν λάβετε πολύ περισσότερο Forcet, επικοινωνήστε αμέσως με τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μπορεί να παρουσιαστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αυτές που παρατίθενται στις "Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες".

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Forcet

Μην λάβετε διπλή δόση ώστε να αντισταθμίσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Forcet μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Μερικά συμπτώματα μπορεί να προκληθούν και από την ίδια την ημικρανία.

- **Αλλεργική αντίδραση: Λάβετε αμέσως ιατρική βοήθεια.**

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν εκδηλωθεί αλλά η ακριβή τους συχνότητα δεν είναι γνωστή.

- **Οι αλλεργικές ενδείξεις περιλαμβάνουν εξάνθημα, κνίδωση (φαγούρα), συριγμό, πρησμένα βλέφαρα, πρόσωπο ή χείλη, πλήρης εξάντληση.**

Εάν εμφανίσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα σύντομα μετά τη χρήση του Forcet:

→ **Μη το χρησιμοποιήσετε άλλο. Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.**

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (προσβάλλουν μέχρι 1 άτομο στα 10)

- **Βάρος, πίεση, σφίξιμο ή πόνος στο στήθος**, λαιμό ή άλλα σημεία του σώματος, ή ασυνήθιστες αισθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του μουδιάσματος, του αισθήματος μυρμηγκίασης και του αισθήματος καύσου ή ψύχους. Αυτές οι επιδράσεις ενδέχεται να είναι έντονες αλλά γενικά περνάνε γρήγορα.

Εάν αυτές οι επιδράσεις συνεχιστούν ή γίνουν σοβαρές (ειδικά ο πόνος στο στήθος):

→ **Λάβετε επειγόντως ιατρική βοήθεια.** Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων αυτά τα συμπτώματα μπορεί να προκληθούν από καρδιακή προσβολή.

Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:

- Αίσθημα ναυτίας, ή τάση έμετου
- Αίσθημα κόπωσης ή υπνηλίας
- Αίσθημα ζάλης, αδυναμίας ή έξαψης
- Προσωρινή αύξηση στην πίεση του αίματος
- Λαχάνιασμα
- Μυϊκό άλγος

Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (προσβάλλουν μέχρι 1 άτομο στα 10.000)

- Αλλαγές στην ηπατική λειτουργία. Εάν υποβληθείτε σε εξετάσεις αίματος για να ελέγξετε τη λειτουργία του ήπατος, αναφέρετε στο γιατρό ή τη νοσηλεύτρια ότι λαμβάνετε το Forcet.

Μερικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά δεν είναι γνωστή η συχνότητα εκδήλωσής τους:

- Επιληπτικές κρίσεις/παροξυσμοί, τρόμος, μυϊκοί σπασμοί, δυσκαμψία αυχένα.
- Οπτικές διαταραχές, όπως τρόμος των οφθαλμών, μειωμένη όραση, διπλή όραση, απώλεια της όρασης και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και μόνιμες διαταραχές (παρόλο που αυτές μπορεί να οφείλονται και στην ίδια την κρίση της ημικρανίας)
- Καρδιακά προβλήματα, κατά τα οποία ο καρδιακός παλμός μπορεί να είναι πιο αργός ή γρήγορος, ή αλλαγή του ρυθμού, θωρακικό άλγος (στηθάγχη) ή καρδιακή προσβολή.
- Ωχρότητα, μελανή απόχρωση στο δέρμα και/ή πόνος στα δάχτυλα των χεριών και στα δάχτυλα των ποδιών, στα αυτιά, στη μύτη ή στη γνάθο σαν αντίδραση του οργανισμού στο κρουολόγημα ή στο άγχος (Φαινόμενο Reynold's)
- Αίσθημα λιποθυμίας (πτώση της αρτηριακής πίεσης)
- Πόνος στο χαμηλότερο αριστερό τμήμα του στομάχου και αιματηρή διάρροια (Ισχαιμική κολίτιδα)

- Διάρροια
- Πόνος στις αρθρώσεις
- Αίσθημα Ανησυχίας
- Υπερβολική εφίδρωση
- Δυσκολία στην κατάποση
- Εάν είχατε πρόσφατο τραυματισμό ή εάν έχετε φλεγμονή (όπως ρευματισμοί ή φλεγμονή του παχέος εντέρου), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε πόνο ή επιδείνωση του πόνου στο σημείο του τραυματισμού ή της φλεγμονής.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα γιατρό σας, ή στο φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr)

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ FORCET

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το Forcet μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά το EXP. Η ημερομηνία λήξεως είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.

Μην χρησιμοποιήσετε το Forcet εάν παρατηρήσετε οισοδήποτε ορατές ενδείξεις αλλοίωσης.

Τα φάρμακά δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Forcet

Η *δραστική ουσία* είναι η σουματριπτάνη .

Forcet 50mg: Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg σουματριπτάνης (ως ηλεκτρική).

Τα *άλλα συστατικά* είναι λακτόζη μονοϋδρική, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη, μαγνήσιο στεατικό και σιδήρου οξείδιο (E172).

Forcet 100mg: Κάθε δισκίο περιέχει 100 mg σουματριπτάνης (ως ηλεκτρική).

Τα *άλλα συστατικά* είναι λακτόζη μονοϋδρική, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη, μαγνήσιο στεατικό.

Εμφάνιση του Forcet και περιεχόμενο συσκευασίας

Τα δισκία Forcet 50 mg είναι ροζ, ωοειδή, αμφίκυρτα με διαχωριστική γραμμή στη μια πλευρά.

Τα δισκία Forcet 100 mg είναι λευκά, ωοειδή, αμφίκυρτα.

Μεγέθη συσκευασίας:

Forcet 50mg

Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την αμοιβαία διαδικασία:

Το κουτί περιέχει 1, 2, 4, 6 ή 12 δισκία σε κυψέλες OPA/Al/PVC αλουμινίου.

Forcet 100mg

Συσκευασίας που εγκρίθηκαν κατά την αμοιβαία διαδικασία:

Το κουτί περιέχει 1, 2, 3, 4, 6, 12 ή 18 δισκία σε κυψέλες OPA/Al/PVC αλουμινίου.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

TARGET PHARMA

Μενάνδρου 54, 10431 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: 210.5224830, Φαξ: 210.5224838,

e-mail: info@targetpharma.gr, <http://www.targetpharma.gr>

Παραγωγός

ONE PHARMA Βιομηχανική Φαρμακευτική Εταιρεία ΑΕ,

60ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,

Σχηματάρι Βοιωτίας.

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Ελλάδα: Forcet

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 09-09-2020